

韓國 軍事運營分析 學會誌
第 11 刊 第 2 號, 1985.12.

整數計劃法을 利用한 프로젝트 拡張順序決定에 関한 研究

姜錫昊*
金智承**

Abstract

Planning for the expansion of production capacity is of vital importance in many applications within the private and public sectors. This paper considers a sequencing expansion problem in which capacity can be added only at discrete points in time.

Given the demand forecast of each period, capacity and cost of each expansion project, we are to determine the sequence of expansion necessary to provide sufficient capacity to meet the demand in all periods at minimum cost. This problem is formulated as a pure integer programming and solved by branch and bound method using Lagrangian relaxation.

At first, simple sequencing expansion problem is presented, and in the latter part, extension to include precedence between projects is suggested.

1. 序論

漸차 늘어나는 需要에 대비하여 生產容量擴張에 관한 계획을 세우는 것은 現代企業이 당면하고 있는 매우 중요한 문제이다. 1950년대 이후 경영과학방법이 이 分野에서 널리 사용되고 있는데, Luss[11]가 分類한 것에 따르면 다음과 같이 나누어 볼 수 있다.

(1) 單一 설비에 있어서의 容量 擴張 문제

(2) 한정된 프로젝트가 있을 때의 容量 擴張 문제

(3) 複數 설비에 있어서의 容量擴張 문제

여기서 다룰 것은 (2)번 즉 한정된 프로젝트가 있을 때의 容量擴張 문제에 관한 것인데, 각期間의 수요가 確定的

* 서울大學校 工科大學

** 國防管理研究所

이고, 개개의 프로젝트에 대해 추가시키는데 드는費用과 운영하는데 드는費用 그리고 각 프로젝트의 容量을 적절히豫測할 수 있을 때 어떤順序대로 프로젝트를 추가시키는 것이 매期間의需要를 만족시키면서總費用을最小化시키는 것인지를決定하려는 것이다. 처음에는 프로젝트간에 상관관계가 없는 기본적인模型과解法을 제시하고 그 다음이 기본model에 프로젝트간의先後관계를 고려한model의解法을 제시할 것이다.

일반적으로, sequencing 문제는動的計劃法으로 많이 풀었는데, 이때까지研究된 것을 간략하게 살펴보면 다음과 같다.

Dale[7]은 프로젝트擴張順序決定模型을 발전소擴張計劃에適用하였다. 즉, 발전소에 動力을 추가시키는데 그時期와 어떤容量의 프로젝트를 추가할 것인가를决定하는 것이다. 그는 이 model에서前進循環式을 이용한動的計劃法을 사용했는데, 문제 크기가 커짐에 따라 즉可能한 狀態(state)의 數가 많아짐에 따라 컴퓨터 저장容量(storage)의 한계때문에近似解를 찾게 되었다.

Ackerman과 Luss[4]는順序決定model을 전화교환기 대체順序를决定하는데適用하였고, Baker와 Schrage[6]는順序에 의해作業이 연결될 때의 문제를 푸는動的計劃法에 대해研究하였는데 여기서 실제 컴퓨터 사용상의 문제점에 많은 관심을 기울였다.

Erlenkotter[8]는時間을 연속적으로 생각한model에 대해 자세히 言及했는데,作業順序決定model을 푸는데 사용되는動的計劃法과 비슷한動的計劃法으로 이와 같은 문제를 푸는方法을 제시했다. 또한 그는[9] 프로젝트간에 상호연

관이 있는model에 대해서도研究하였다. 이와 같이sequencing 문제를動的計劃法으로 많이 풀어 왔는데, Erlenkotter[8] 그리고 Baker와 Schrage[6]가 지적했듯이動的計劃法은프로젝트數가 많아짐에 따라計算上에 어려움이 따른다. 그래서 여기서는Lagrangian relaxation을 사용한分枝限界法(Branch and Bound method)을 이용하여이 문제를解决하려는 것이研究目的이라하겠다.

2. 基本 模型

이 model은時間을이산적(discrete)으로생각했을 때 生產容量擴張順序를决定하는 것이다. 여기에必要的 가정들은 다음과 같다.

- (1) 각期間에 요구되는需要는確定的이고需要는시간에 따라減少하지 않는다.
- (2) 각프로젝트의容量과費用은알려져 있다.
- (3)計劃期間은有限하고프로젝트갯수도限定되 있다.
- (4)프로젝트容量은한번추가되면, 전기간이끝날때까지그capacity는지속된다.
- (5) 초기容量은없다고한다.
- (6)기간t에사용可能한총容量은그期間의需要보다적어도같거나커야한다. 즉需要는만족되어야만한다.
- (7)프로젝트capacity는즉시추가될수있다.
- (8)한기간에많아야하나의프로젝트만추가될수있다.

이 가정은現實에model을適用시킬때

많이 생기고 또한 시간을 연속적으로 생각한 模型에서도 자주 강조된다.

위와 같은 가정하에 이 문제를 다음과 같이 0-1 整數計劃法으로 模型化시킬 수 있다.

Minimize

$$\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik}) x_{it}$$

subject to

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1 \text{ for all } i \in I \quad (2-1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} \leq 1 \text{ for all } t = 1, 2, \dots, T \quad (2-2)$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{i=1}^n g_i x_{it} \geq d_k \text{ for all } k = 1, 2, \dots, T \quad (2-3)$$

$$x_{it} = 0, 1 \quad (2-4)$$

where

T : 計劃 期間 (즉, $t = 1, 2, \dots, T$)

$I = \{1, 2, \dots, n\}$: 프로젝트 i 의 집합

g_i : 프로젝트 i 의 容量(정수)

c_{it} : 프로젝트 i 를 期間 t 에 추가시키는데 드는 費用(정수)

O_{it} : 프로젝트 i 를 기간 t 에 운영하는데 드는 비용

d_t : 期間 t 의 需要(정수)

x_{it} : $\begin{cases} 1 & : \text{프로젝트 } i \text{ 가 期間 } t \text{ 에 추가될 때} \\ 0 & : \text{o.w.} \end{cases}$

위의 모형에서

제약식 (2-1)은 모든 프로젝트는 많아야 한번 추가될 수 있다는 것을 뜻하고, 제약식 (2-2)는 한 期間에 많

아야 한 프로젝트가 추가될 수 있다는 것을 뜻하고, 제약식 (2-3)은 需要는 만족되어야만 한다는 것을 의미한다.

3. Lagrangian Relaxation 과 Subgradient Optimization

원 문제에서 제약식 (2-3)이 문제를 풀기 어렵게 만든다. 그래서 Lagrangian relaxation을 사용하여 제약식 (2-3)을 완화시킨다. μ 를 Lagrange 백터로 놓고 μ_k 를 제약식 (2-3)의 k 번째에 해당하는 Lagrange 송수라고 하자. 그러면 완화된 Lagrangeian 문제는 다음과 같이 된다.

$$L(\mu) = \text{Minimize } L(\mu: x)$$

$$= \text{Minimize } \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik} -$$

$$g_i \sum_{k=t}^T \mu_k) x_{it} + \sum_{t=1}^T \mu_t d_t \quad (3-1)$$

subject to

$$(2-1), (2-2), (2-4), \mu_k \geq 0 \text{ for all } k = 1, 2, \dots, T$$

(3-1)과 같이 완화된 Lagrangian 문제는 배정문제 (assignment problem) 기법을 이용하여 쉽게 解를 구할 수 있다. 여기에 관한 것은 다음 절에서 상세히 다루기로 한다.

\bar{X} 가 (3-1)의 解라고 놓고, $L(\mu: \bar{X})$ 를 주어진 μ 에 대한 목적 함수 값이라 하자. 그러면 $L(\mu: \bar{X})$ 는 원 문제의 하한 경계치 (lower bound)가 된다. [14] 최적의 Lagrangian 백터 μ 는 다음 문제의 최적해가 된다.

Maximize $L(\mu : \bar{X})$

subject to $\mu \geq 0$ (3-2)

좋은 Lagrange 승수 벡터를 얻기 위해 서 여기서는 subgradient 알고리듬을 사용한다. subgradient 알고리듬은 초기 Lagrange 승수 벡터 μ^0 를 가지고 시작하여 차례차례 $\mu^1, \mu^2, \dots, \mu^s$ 를 구해나가는 方法인데, 一般的으로 원 문제에 適用될 때는 S를 20에서 60 사이로 잡고, 그 이하의 후보 문제(candidate problem)에 適用될 때는 10이하로 잡는다. S가 커짐에 따라 μ^s 는 (3-2)의 최적해에漸近的으로 收斂한다.

$L(\mu : \bar{X})$ 는 分枝限界法에서 단지 후보 문제의 하한 경계치로 사용되기 때문에 (3-2)의 최적해를 반드시 얻어야만 되는 것은 아니다. 될수 있는 한 $L(\mu : \bar{X})$ 가 큰 Lagrange 승수 벡터 μ^* 를 얻어 사용하면 되는 것이다.

subgradient 최적화 알고리듬을 정리해 보면 다음과 같이 2단계로 나눌 수 있다.

(1) 초기 Lagrange 승수 벡터 $\mu^0 \geq 0$ 을 선택한다.

원 문제에 相應한 하한 경계치를 구 할 때는 일반적으로 μ^0 를 0으로 잡고 그 밖의 후보 문제를 풀 경우에는 그 前 마디(previous node)의 μ^* 를 초기 Lagrange 승수 벡터로 잡는다.

(2) 주어진 μ^j 에 대해 다음 번 Lagrange 승수 벡터는 다음과 같이 구해 진다.

$$\lambda_j = \rho_j (\bar{L} - L(\mu^j)) / \|V^j\|$$

로 놓으면

$$\mu_i^{j+1} = \max\{0, \mu_i^j + \lambda_j V_i^j\}$$

for all $i = 1, 2, \dots, T$

where V^j = subgradient 벡터

$$\epsilon \leq \rho_j \leq 2$$

ρ_j 에 대한 초기 값으로는 一般的으로 2를 잡는다. 마지막 d단계 동안에 $L(\mu^j)$ 의 값이 증가하지 않으면, ρ_j 의 값을 반으로 줄인다.

\bar{L} 는 $L(\mu : \bar{X})$ 의 상한 경계치인데 여기서는 現 완전해의 목적함수 값을 \bar{L} 로 잡았다.

4. Lagrangian 문제의 解法

주어진 μ 에 대해 (3-1)을 푼다는것 은

$$S_{it} = C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik} - g_i \sum_{k=t}^T \mu_k$$

로 놓으면 다음과 같은 문제를 푸는 것과 同一하다.

$$\begin{aligned} \text{Minimize } & S_{it} \quad x_{it} \\ \text{subject to } & \end{aligned} \quad (4-1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} \leq 1 \quad \text{for all } t = 1, 2, \dots, T$$

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1 \quad \text{for all } i \in I$$

$$(\mu_k \geq 0 \text{ for all } k = 1, 2, \dots, T)$$

윗 문제는 전형적인 配定 문제로 변 화될 수 있다. 즉 바이퍼타이트(bipartite) 네트워크를 만들기 위해서 i에는 T개, t에는 n개의 假지점(dummy node)을 추가시켜 이 假지점에 연결된 費用을 0으로 놓으면 配定 문제와 同一한 다음 模型과 같이 (4-1)을 변환시킬 수 있다.

$$\begin{aligned} \text{Minimize } & S'_{it} \quad x_{it} \\ \text{subject to } & \end{aligned} \quad (4-2)$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n x_{it} &= 1 \quad \text{for } t = 1, 2, \dots, T, \dots \\ &n + T \end{aligned}$$

$$\sum_{t=1}^{n+T} x_{it} = 1 \text{ for } i = 1, \dots, n, \dots, n+T$$

where

$$S'_{it} = \begin{cases} S_{it} & 1 \leq i \leq n, 1 \leq t \leq T \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

5. 分枝限界法

subgradient 최적화 알고리듬을 適用해서 얻은 解가 원 문제의 최적해는 아니다. 그래서 分枝限界法이 최적해를 얻기 위해 사용된다.

후보 문제에 Lagrangian relaxation 을 適用시키는 과정에서 緩和된 문제의 최적해가 원 문제의 모든 제약식을 만족시키고 또한 補充的 餘裕條件 (complementary slackness condition) 인

$$\mu_k \cdot [d_k - \sum_{t=1}^k \sum_{i=1}^n g_i x_{it}] = 0, \text{ for all}$$

$$k = 1, 2, \dots, T$$

를 만족시키면 즉, 후보 문제의 하한 경계치 $L(\mu : X)$ 와 완화된 문제의 최적해에 相應한 원 문제의 목적함수 값이 같으면 分枝完了 (fathom) 가 된다. 만약 후보 문제가 分枝完了가 되지 않으면, 다시 分枝 전략이 적용되어 2개의 새로운 후보 문제를 형성하게 된다.

$x_{it} = 0$ 인 集合을 X_0 로 놓고, $x_{it} = 1$ 인 集合을 X_1 으로 놓으면, 分枝 나무의 어느 마디에서나 다음과 같은 제약식이 하나 더 추가된다.

$$x_{it} = 0 \text{ for all } x_{it} \in X_0$$

$$x_{it} = 1 \text{ for all } x_{it} \in X_1$$

어떤 x_{it} 가 X_1 에 속하게 되면, 나머지 $x_{it} (t \neq k)$ 들은 모두 X_0 에 속하게 된다.

위의 제약식하에서 후보 문제를 配定 문제로 풀기 위해서는 M 을 매우 큰 양의 整數로 놓았을 때, X_0 에 속하는 x_{it} 에 해당되는 費用 C_{it} 는 M , X_1 에 속하는 x_{jk} 에 해당되는 費用 C_{jk} 는 $-M$ 으로 놓고 풀면 된다.

分枝 전략으로 $r_t (= d_t - d_{t-1})$ 가 처음으로 양이 되는 기간 k 와 X_0 나 X_1 에 속하지 않은 j 를 선택한다. 이와같이 하여 2개의 새로운 마디를 형성한 후 한쪽에는 $x_{jk} = 0$, 다른 한쪽에는 $x_{jk} = 1$ 로 놓는다.

一般的인 探索 전략은 가장 적은 하한 경계치를 갖는 마디를 선택하여 그 마디를 다시 分枝하는 것이다. 그러나 이 전략은 매우 많은 計算量을 必要로 할지 모른다. 그래서 여기서는 LIFO (last-in-first-out) 方法을 썼는데, 이 방법은 하나의 후보 문제만을 가지고 있고 나머지는 스택(stack)에 저장시키는 것이다. 즉, 現 후보 문제가 分枝 끝이 되면 스택에서 새로운 후보문제를 선택한다.

LIFO 方法에서는 마지막으로 스택에 들어온 후보 문제가 선택되게 된다. [2]

이 探索 전략이 사용되면, 分枝限界法은 스택에서 후보 문제를 선택해야 할 때, 스택이 비어 있으면 끝나게 된다. 그리고 이 단계까지의 완전해 (incumbent solution) 가 원 문제의 最適解가 된다.

6. 프로젝트간에 先後관계가 있는 模型

이 模型은 앞의 기본 模型에 프로젝트간의 先後관계를 고려한 것인데, 이 경우 기본 模型과 같은 方法으로 풀기가 어려우므로 조금 다르게 模型화시켰다.

만약 프로젝트 a가 추가되기 위해서는 프로젝트 b가 먼저 추가되어야 한다면, t 기간 初에 남는 容量 y_t 를 決定변수로 집어 넣어 다음과 같이 模型化시킬 수 있다. 先後관계에 해당되는 제약식은 여러 개일 수도 있다.

$$\text{Minimize} \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik}) x_{it}$$

subject to

$$\sum_{t=1}^T x_{it} \leq 1 \text{ for all } i \in I \quad (6-1)$$

$$\sum_{i=1}^n x_{it} \leq 1 \text{ for all } t = 1, 2, \dots, T \quad (6-2)$$

$$\sum_{i=1}^n g_i x_{it} + y_t - y_{t+1} = r_t \text{ for all } t = 1, 2, \dots, T \quad (6-3)$$

$$\sum_{i=1}^T (x_{at} - x_{bt}) \geq 0 \quad (6-4)$$

$$x_{it} = 0 \text{ or } 1 \quad (6-5)$$

$$y_t \geq 0 \quad (6-6)$$

제약식 (6-1), (6-2), (6-5)은 기본 模型과 같고, 제약식 (6-6)은 새로이 添加된 決定 변수 y_t 에 관한 것이고, 제약식 (6-4)은 先後 관계를 나타내는 것이다. 그리고 제약식 (6-3)은 容量 均衡式 (capacity balance equation)인데 y_t 의 정의에서 유도된다.

윗 模型은 기본 模型처럼 Lagrangian 문제를 配定 문제 기법으로 풀기가 좋지 않다. 왜냐하면, 기본 模型처럼 풀기 위해서는 2개의 제약식을 緩和시켜야 하는데, 先後 관계가 많아짐에 따라 解의 性質이 나빠지기 때문이다. 그래서 이 模型에서는 제약식 (6-1)을 緩和시켜 Lagrangian 문제를 後進循環式을 이용한 動

的計劃法으로 풀었는데, 이 動的計劃法에서는 프로젝트 간의 先後 관계를 쉽게 처리할 수 있다.

제약식 (6-1)이 緩和된 Lagrangian 문제는 아래와 같이 된다.

Minimize $L(\mu : X)$

$$= \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik} + \mu_i) x_{it} -$$

$$\sum_{i=1}^n \mu_i$$

subject to

$$(6-2) \sim (6-6)$$

$$\mu_i \geq 0 \text{ for all } i = 1, 2, \dots, n$$

윗 문제는 t 기간에 프로젝트 i를 추가시키는데 드는 費用이 $(C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik} + \mu_i)$ 로 변환되었다고 볼 수 있다. 그러므로 μ 에 대해 보면, 윗 문제는 변환된 總 費用을 最小化하는 프로젝트를 매期間 決定하는 것이다. 다만 여기서는 한 프로젝트가 여러번 추가될 수 있다 는 것만이 다른 條件이 된다.

이 Lagrangian 문제는 期間 t를 단계 (stage)로 생각하여 動的計劃法으로 풀 수 있다. 단계 t에서의 狀態 변수 (state variable)는 y_t 가 된다. 後進循環式을 써 보면 아래와 같다.

初期 條件 $F_{T+1}(y_{T+1}) = 0$ for all

$$y_{T+1} \geq 0$$

$$F_t(y_t) = \text{Min}_{y_{t+1}} \{ k_t (r_t + y_{t+1} - y_t) + F_{t+1}(y_{t+1}) \}$$

subject to

$$\text{Max} \{ 0, y_t - r_t \} \leq y_{t+1} \leq y_t - r_t + g(1)$$

for $y_t = 0, 1, 2, \dots, u(y_t)$

where

$F_t(y_t)$: t 期間 初에 남는 容量이 y_t 일 때 남은 期間의 最小 總費用

$k_t(b)$: 期間 t 에 容量 b 만큼 추가 시키는데 드는 最小 費用

$g(i)$: 가장 큰 g_i , $i=1, 2, \dots, n$

$u(y_t)$: y_t 的 상한 상계치

$$(\min_{i=1}^{n, t-1} g(i) - \sum_{j=1}^{t-1} r_j)$$

이 後進循環式에서 $k_t(b)$ 는 다음과 같아 쉽게 구할 수 있다.

$$k_t(b) = \min_i \left\{ C_{it} + \sum_{k=t}^T O_{ik} + \mu_i / g_i = b, \quad x_{it} \in X_0 \cup X_1 \right\}$$

$k_t(b) = \infty$ if $b \leq g_i$ for any

$$x_{it} \in X_0 \cup X_1$$

7. 結論 및 討議事項

이상에서 본 바와 같이, 프로젝트 擴張順序 決定模型은 整數計劃法으로 模型化하여 Lagrangian relaxation을 이용한 分枝限界法으로 풀 수 있었다. 또한一般的인 動的計劃法으로 풀 때의 문제점인 “curse of dimensionality” 즉 프로젝트 數가 많아짐에 따라 計算量이 매우 급하게 증가하는 문제점을 어느 정도 解決할 수 있었다.

이 模型은 水資源 시스템같이 限定된 프로젝트 집합에서 어느 특정 프로젝트를 추가시킴으로써 容量을 증가시킬 수 있는 分野에서 사용되어 진다.

한편, 추후 研究 課題로서

- (1) 각 프로젝트별로 여러 容量 水準이 있을 때
- (2) 容量간에 어떤 상관 관계가 있을 때

때

(3) 費用간에 어떤 상관 관계가 있을 때 등이 있는데

(1) 번은 X에 0, 1 뿐만 아니라 2, 3, 4, … 를 취할 수 있게 함으로써 解決될 수 있을 것이다. 이 경우 計算量이 매우 增加하게 되므로 이 문제를 解決하는 方案도 아울러 研究되어야 할 것이다.

(2) 번은 프로젝트 간의 先後관계를 包含한다고 할 수 있는데, 예를 들어 보면, 어떤 프로젝트의 容量이 다른 특정 프로젝트가 추가되어 있지 않을 경우에는 완전히 사용 可能할 수 없는 경우를 말한다.

References

1. 강석호, Operations Research, 영지문화사, 서울, 1980.
2. 홍영식, 엄기현, 자료구조, 정익사, 서울, 1982. 53~71.
3. Geoffrion, A.M., “Lagrangian Relaxation for Integer Programming,” *Mathematical Programming Study* 2, 1974, 82-114.
4. Ackerman, L.J., Luss, H. and Berkowitz, R.S., “Application of Sequencing Policies to Telephone Switching Facilities,” *IEEE Trans. SMC* 7, 1977, 604-609.
5. Baker, K.R., *Introduction to Scheduling and Sequencing*, John Wiley & Sons, Inc., 1974.
6. Baker, K.R., and Schrage, L.E., “Finding an Optimal Sequence by Dynamic Programming: An Extension to Precedence-related Tasks,” *Operations Research*, 26, 1978, 111-120.

7. Dale, K.M., "Dynamic Programming Approach to the Selection and Timing of Generation-Plant Additions," *Proc. Institute Electrical Engineering*, 113, 1966, 803-811.
8. Erlenkotter, D., "Sequencing Expansion Projects," *Operations Research*, 21, 1973, 542-553.
9. Erlenkotter, D., "Sequencing of Interdependent Hydroelectric Projects," *Water Resource Research*, 9, 1973, 21-27.
10. Weingartner, H. Martin, "Capital budgeting of Interrelated Projects: Survey and Synthesis," *Mgt. Science*, 7, 1966, 485-516.
11. Luss, H., "Operations Research and Capacity Expansion Problems: A Survey," *Operations Research*, 30, 1982, 907-947.
12. Murty, K., *Linear and Combinatorial Programming*, John Wiley and Sons, Inc., 1976, 437-446.
13. Manne, A.S. (ed), *Investments for Capacity Expansion, Size, Location and Time-phasing*, MIT press, Cambridge, Mass., 1967.
14. Fisher, M., "The Lagrangian Relaxation Method for Solving Integer Programming Problems," *Mgt. Science*, 27, 1981, 1-18.
15. Larson, R.E., and Casti, J., *Principles of Dynamic Programming*, Marcel Dekker, Inc., 1982.